

ИНСТРУКЦИЯ

по применению назального

MELANOTAN 2 nasal spray 20 mg (Меланотан 2 спрей (20 mg))

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Melanotan 2 спрей

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: прозрачная жидкость

ФОРМУЛА: C50H69N15O9

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 1024.2

ВЕС НЕТТО: 20 mg (20000 meg)

ЧИСТОТА ПЕПТИДА: >98%

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: Ac-Nle-Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys-NH₂-(cyclic 2-7)

Меланотан 2 (MT2) — инновационный способ стимуляции загара и предотвращения вредных последствий УФ-излучений. MT2 – это синтетический пептид, аналог натурального гормона Меланокортина, который является основным фактором стимулирующим клетки кожи к производству меланина, пигмента, окрашивающего кожу и защищающего кожу от вредных УФ-лучей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяется в случаях когда нарушена функция выработки пигмента (меланина), путем стимуляции гипофиза на выработку данного пигмента, а так же для защиты от УФ-излучения путем появления видимого загара

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат противопоказан беременным и кормящим, а также женщинам в период лактации.

Лицам, не достигшим 18 лет.

Противопоказан людям с какими-либо видами опухолей.

Противопоказан людям с признаками меланомы и гиперпигментации.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат используется назально при помощи дозатора, ежедневно, несколько раз в сутки, в зависимости от Вашего веса, в любое удобное время.

Дозировки указаны в разделе ДОЗИРОВКА. 1 использование считается по 1 впрыску в каждую ноздрю.

Курс применения препарата составляет 10-15 дней.

При слабозаметном эффекте курс можно продлить до достижения нужного результата, но не более 30 дней ежедневного использования.

Период между использованиями должен быть не менее 2 часов.

В течение курса необходимо обязательно посещать солярий, либо загорать на Солнце не менее 3-4 раз. Первый поход в солярий осуществить после 3-4 дней использования препарата. Загорать необходимо с промежутком в 3-4 дня. 4-8 минут в солярии будет вполне достаточно.

При достижении желаемого загара, препарат используется 1-2 дня в неделю (по желанию), по полному дню для поддержания загара.



Шаг 1

Снимите защитный колпачек.



Шаг 2

Проверьте пульверизатор. Нажмите на белый аппликатор и удерживайте до получения струи.



Шаг 3

Немного наклоните голову вперед. Вставьте аппликатор в ноздрю и сделайте впрыск. Прodelайте то же самое для второй ноздри.



Шаг 4

Наклоните голову назад и сделайте обычный вдох.

ДОЗИРОВКА

Разовая дозировка спрея рассчитывается в зависимости от вашего веса и указана ниже в таблице.

ВЕС	КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКИВАНИЙ В ДЕНЬ	ИТОГО ВПРЫСКИВАНИЙ В СУТКИ
50 кг	3 раза в сутки, в обе ноздри	6 впрыскиваний в сутки
75 кг	4 раза в сутки, в обе ноздри	8 впрыскиваний в сутки
100 кг	5 раз в сутки, в обе ноздри	10 впрыскиваний в сутки

Рекомендуется придерживаться данных дозировок, либо ниже, с учетом особенностей организма, так как они считаются наиболее оптимальными и безопасными.

Большие дозировки позволят быстро загореть, но так же могут привести к появлению веснушек и гиперпигментации.

Необходимо относиться к этому серьезно, а также внимательно следить за состоянием кожного покрова.

При первых признаках появления веснушек рекомендуется снизить дозировку на 30%.

Идеальных схем применения не существует, так как организм у всех разный, поэтому если Вы считаете, что Ваша дозировка должна быть выше, то это Ваш выбор.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуется увлажнять кожу при использовании **Меланотан 2 спрей** для предотвращения появления "меланотановых веснушек".

Спрей можно использовать за 40 минут -1 час до похода в солярий. Это усилит эффект от использования Меланотан 2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется использовать совместно с сильнодействующими антибиотиками.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Повышение артериального давления – как правило, проявляется при 1-ой - 3 инъекции, далее организм привыкает к

препарату и данный побочный эффект пропадает. Поэтому людям страдающим от повышенного давления следует с осторожностью относиться к препарату.

Тошнота и неприятные ощущения в области живота – при использовании препарата возможно появление легкой тошноты и неприятных ощущений в области живота. Это связано с тем, что препарат способен влиять на пищеварительный тракт. При данном побочном эффекте рекомендуется снизить дозировку и делать инъекции на ночь перед сном.

Появление веснушек – возможно появление веснушек, в местах скопления меланина, для того чтобы предотвратить этот побочный эффект рекомендуется увлажнять кожу и снизить как частоту использования препарата на 50 %. Появление веснушек это временное и обратимое явление, как правило они пропадают через 3-6 недель после отказа от препарата.

Повышение либидо – как правило, повышение либидо в основном наблюдается у мужчин, и проявляется в виде спонтанной эрекции. Вероятность повышения либидо у женщин 20%, как правило, проявляется при повышенных дозировках.

Покраснение кожи – покраснение кожи вызвано повышением артериального давления и как правило проходит через 30 минут после применения.

Потеря аппетита – при использовании **Меланотан 2 спрей**, может проявляться потеря аппетита.

Похудение – при использовании **Меланотан 2 спрей** есть вероятность того, что Вы сможете похудеть, так как он ускоряет липолиз (расщепление) жирных кислот, но при условии физических нагрузок и кардио тренировок.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Меланотан 2 спрей необходимо хранить в холодильнике, при температуре от 2 до 8 °С.

При длительном хранении спрея вне холодильника, его свойства теряются.

Транспортировка спрея возможна без охлаждения не более 2-х суток.

Срок годности препарата 3 месяца, после начала использования.

Срок годности до вскрытия, указан на этикетке.

Спрей не трясти, не ронять, не взбалтывать!

Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.